



IMAGERIE MÉDICALE | MEDICAL IMAGING

WESTMOUNT SQUARE

1 Westmount Square, Suite C-210
Westmount (Québec) H3Z 2P9
Tél.: (514) 939-9764 Fax : (514) 939-9363
www.radiologymontreal.com

ARTHROGRAPHIE DIAGNOSTIQUE: INSTRUCTIONS POST-PROCÉDURE

Durant l'arthrographie diagnostique, le médecin injecte un agent de contraste dans la région concernée. Cela permet de visualiser l'articulation lors de votre tomographie axiale (CT scan) ou de votre résonance magnétique (IRM).

Vous pouvez ressentir de la douleur au niveau du site d'injection pour une durée de 1 à 3 jours après la procédure.

Nous vous déconseillons de participer à des activités sportives requérant l'utilisation de la région impliquée pour une période de 48 heures.

L'application de glace sur la région pour 10 minutes à la fois, plusieurs fois dans la journée, aidera à diminuer la douleur. Il est aussi recommandé de prendre du Tylenol ou de l'Advil pour apaiser la douleur comme il est prescrit sur le contenant.

Si la douleur persiste au-delà de 72 heures, malgré la prise d'analgésiques, veuillez consulter votre médecin.

Vous pouvez rejoindre notre infirmière au (514) 939-9764 poste 2711.

DIAGNOSTIC ARTHROGRAM: POST-PROCEDURE INSTRUCTIONS

During a diagnostic arthrogram, the doctor will inject a contrast agent into the area of interest. This is to help visualize the joint during your CT scan or MRI.

You may develop pain at the site of the injection for 1 to 3 days after the procedure.

We advise you not to practice any sports or activities that require the use of the joint in question for up to 48 hours.

Applying an ice pack to the area for 10 minutes several times throughout the day, will help relieve the pain. It is also recommended that you take Tylenol or Advil for pain relief as prescribed on the bottle.

If there is no relief after 72 hours, please consult your physician.

You may contact our nurse at (514) 939-9764 ext. 2711.