



IMAGERIE MÉDICALE | MEDICAL IMAGING

WESTMOUNT SQUARE

1 Westmount Square, Suite C-210
Westmount (Québec) H3Z 2P9
Tél.: (514) 939-9764 Fax : (514) 939-9363
www.radiologymontreal.com

RECOMMANDATIONS APRÈS UNE TOMOGRAPHIE AVEC CONTRASTE POUR PATIENTS DIABÉTIQUES PRENNANT DU METFORMINE OU GLUCOPHAGE.

Afin de prévenir des dommages pouvant survenir au niveau des reins, il faut arrêter de prendre du metformine ou Glucophage la journée de l'examen et 48 heures après votre tomographie. Vérifiez avec votre médecin s'il n'y a pas de contre indications.

Buvez beaucoup d'eau après l'examen pour faciliter l'élimination du contraste injecté durant l'examen.

Faire une prise de sang pour obtenir votre niveau de créatinine seulement s'il y a un changement dans vos habitudes urinaires, c'est-à-dire si vous uriner moins qu'à l'habitude. Il est important d'en informer votre médecin dans les plus brefs délais.

Vous pouvez recommencer à prendre votre metformine ou Glucophage 48 heures après l'examen.

Vous pouvez rejoindre notre infirmière au (514) 939-9764 poste 2711.

RECOMMANDATIONS AFTER A CT SCAN WITH CONTRAST FOR DIABETIC PATIENTS TAKING METFORMIN OR GLUCOPHAGE

In order to prevent damage to the kidneys, you must stop taking metformin or Glucophage the day of the exam and for a period of 48 hours after the CT scan. First check with your physician if there is contraindication.

Drink a lot of water after your exam in order to eliminate the contrast agent injected during your examination.

Have a blood test to obtain your creatinine level if there is any difference in voiding habits, i.e. such as decrease urination after the exam. You must report immediately to your physician.

You may resume taking metformin or Glucophage 48 hours after your examination.

You may contact our nurse at (514) 939-9764 ext. 2711.