



IMAGERIE MÉDICALE | MEDICAL IMAGING

WESTMOUNT SQUARE

1 Westmount Square, Suite C-210  
Westmount (Québec) H3Z 2P9  
Tél.: (514) 939-9764 Fax : (514) 939-9363  
www.radiologymontreal.com

## RECOMMANDATIONS APRÈS UN LAVEMENT BARYTÉ

Après la procédure, il est important de boire beaucoup de liquide tiède ou de la soupe pour 24 à 48 heures. Cela aidera à apaiser les crampes ou les ballonnements et à éliminer le baryum de vos intestins.

Les crampes et les ballonnements sont causés par l'air et le baryum introduit dans vos intestins durant l'examen. Si les ballonnements ou les crampes persistent vous devriez consulter votre médecin.

Si vous avez reçu du buscopan pour votre examen, vous pourriez avoir une vision trouble ou la bouche sèche comme effets secondaires. Ne vous inquiétez pas, ces symptômes disparaîtront dans les 30 à 60 minutes suivant votre examen.

Vous pouvez rejoindre notre infirmière au (514) 939-9764 poste 2711.

## RECOMMANDATIONS AFTER A BARIUM ENEMA

After the procedure, it is important to drink plenty of warm liquids or soups for the next 24 to 48 hours. This will help soothe the bloating and cramping, as well as helping to eliminate the barium from your intestines.

Should you develop cramping or bloating after this exam, it could be due to the air and barium that was introduced into your intestines during the procedure. If the bloating or cramping persist, you should contact your physician.

If you received buscopan for this procedure, you may develop a dry mouth and a blurred vision. Do not worry, these symptoms will disappear within 30 to 60 minutes after the procedure.

You may contact our nurse at (514) 939-9764 ext. 2711.